

INFOLIVE – PROTECTION RAISONNÉE DE L'OLIVIER

Bulletin n° 4, le 15 juin 2010



ŒIL DE PAON

Des pluies et des orages sont annoncés pour cette semaine sur toutes les régions. Les conditions climatiques sont toujours très favorables au développement de la maladie. De nouvelles tâches font leur apparition, suite aux contaminations de fin mai.

Cependant, il est peu conseillé de traiter sur fleurs et sur nouaison. Il est préconisé d'arrêter les traitements pour cette saison, dans les parcelles où le nombre de feuilles malades est inférieur à 15%. Renouveler une dernière fois la protection à demi-dose sur les variétés sensibles.

TEIGNE DE L'OLIVIER

Le second vol de teigne a débuté dans les zones précoces. D'après le Bulletin de Santé du Végétal Oléiculture n°1, il n'est pas nécessaire de traiter sur cette génération. Toutefois, pour les vergers sensibles présentant plus de 10% de grappes florales atteintes, il est possible d'intervenir dans les vergers à basse altitude à partir des dates suivantes :

Zone altitude	Date intervention
< 150 m	25-28 juin
150 – 300 m	2-5 juillet

Pour les autres zones d'altitude, attendre le prochain bulletin

Produits autorisés sur oliviers * sur cette génération :

Matière active	Spécialités	Dose de spécialité	DRE	ZNT	Conditions
Lambda-cyhalothrine	Karaté Zeon	0,015 l/hl	48 h	20 m	2 applications maximum par an
	Pool	0,03 kg/hl	48 h	5 m	
	Karaté Xpress	0,03 kg/hl	48 h	5 m	
	Agrotech lambda-cyhalothrine 100 CS	0,015 l/hl	48 h	20 m	
	Karachoc	0,03 l/hl	24 h		

* Consulter l'étiquette DRE= délai de rentrée dans le verger après un traitement ZNT= Zone Non traitée

La lutte biologique n'est plus possible sur cette génération.

MOUCHE DE L'OLIVE

Le réseau de piégeage de la mouche de l'olive est en place, mais pour le moment aucune mouche n'a été capturée sauf sur le secteur de Montpellier. Le développement des fruits est très en retard par rapport aux années précédentes : les zones les plus précoces sont au stade nouaison – début de grossissement du fruit ; les zones plus tardives débutent la floraison.

Pour les olives vertes de table uniquement, attendre la fin du mois ou le prochain bulletin pour prévoir une première intervention préventive adulticide.

Pour les autres vergers, attendre un prochain bulletin pour une première intervention.

INFOLIVE est une feuille d'information et de préconisation établie par le Centre Technique de l'olivier pour le compte de l'AFIDOL, à partir du Bulletin de Santé de l'Olivier. Ce document n'est pas contractuel et les informations données n'ont qu'une valeur indicative. Les informations présentes sur l'étiquette des produits ont valeur de loi. * Liste établie à partir de la base e-phy du ministère de l'agriculture

CENTRE TECHNIQUE DE L'OLIVIER


Maison des Agriculteurs 22 av. Henri Pontier 13626 Aix en Provence Cedex 1 ☎ 04.42.23.01.92 - 📠 04.42.23.82.56 E-mail : contact@ctolivier.org



Les prévisions d'évolution de la mouche de l'olive sont réalisées à partir de 160 sites de piégeage et de 41 stations météorologiques (27 en Provence, 14 en Languedoc).

Tous les résultats de piégeage de la mouche de l'olive sont disponibles sur
www.afidol.org/gestoliveprod

Les bulletins diffusés en cours de campagne, décrivent une situation générale sur une zone de production. Il faut adapter la stratégie de lutte en tenant compte des observations personnelles et des caractéristiques spécifiques de l'olivieraie (sol, variétés, environnement, techniques culturales, micro climat...). Ainsi, **il est fortement conseillé de mettre en place sur vos parcelles des pièges à mouches**. Il en existe de différents types, dont les plus efficaces sont :



Piège alimentaire
rempli d'une
solution de
phosphate ou
sulfate
d'ammoniaque à
3%



Piège
chromatique et
sexuel

Les relevés sont effectués deux fois par semaine, en enlevant les mouches à chaque fois.

COCHENILLE NOIRE

Hormis sur des foyers signalés à forte population, en général, la population de cochenille est plutôt faible. La cochenille est au stade de ponte sur les vergers précoces. Il n'est pas encore temps pour intervenir avec un larvicide chimique. Attendre le prochain bulletin.

Remarque : en bio, contre la cochenille, le meilleur moyen de lutte est la taille des rameaux atteints.

Le Bulletin de Santé du Végétal Oléiculture est disponible sur www.afidol.org rubrique BSV

INFOLIVE est une feuille d'information et de préconisation établie par le Centre Technique de l'olivier pour le compte de l'AFIDOL, à partir du Bulletin de Santé de l'Olivier. Ce document n'est pas contractuel et les informations données n'ont qu'une valeur indicative. Les informations présentes sur l'étiquette des produits ont valeur de loi. * Liste établie à partir de la base e-phy du ministère de l'agriculture

CENTRE TECHNIQUE DE L'OLIVIER

Maison des Agriculteurs 22 av. Henri Pontier 13626 Aix en Provence Cedex 1 ☎ 04.42.23.01.92 - 📠 04.42.23.82.56 E-mail : contact@ctolivier.org

