



Afidol

Infolive Protection raisonnée

Bulletin n°10a, le 30 septembre 2008

Bulletin rédigé en concertation avec le SRPV PACA

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR - CORSE

Mouche de l'olive

Rappel : Nous vous rappelons que la décision de lutte est à adapter en fonction de vos observations, vos techniques culturales (irrigation...) et de la situation environnementale de votre verger (cours d'eau, oliviers abandonnés...).

RESPECTEZ LES CONSIGNES D'UTILISATION DES PRODUITS (voir en particulier le tableau ci-dessous).

ZONE DE PRODUCTION INFÉRIEURE À 150 METRES D'ALTITUDE

Le vol se poursuit dans la plupart des sites de piégeage. Les températures fraîches ralentissent le développement des larves.

Lutte raisonnée

Rappel : Renouvelez la protection préventive 15 jours après le dernier traitement préventif, avec des spécialités à base de lambda-cyhalothrine, de deltaméthrine ou de spinosad.

Si le taux de piqûres de ponte est supérieur à 10% pour les olives à huile ou 2% pour les olives de table, il est préférable d'utiliser la lutte curative (produit à base de diméthoate) trois semaines après le dernier traitement curatif ou 10 jours après le dernier traitement préventif.

Lutte biologique

Un renouvellement de l'application avec Syneis-appât peut être réalisé 15 jours après le précédent traitement, ou après une pluie supérieure à 5 millimètres.

ZONE DE PRODUCTION ENTRE 150 ET 300 METRES D'ALTITUDE

Le nouveau vol démarre.

Lutte raisonnée

La lutte préventive est à réaliser dès à présent ou 15 jours après le précédent traitement préventif, avec des produits à base de lambda-cyhalothrine, de deltaméthrine ou de spinosad, dans le respect des consignes de sécurité.

Si le taux de piqûres de ponte est supérieur à 10% pour les olives à huile ou 2% pour les olives de table, il est préférable d'utiliser la lutte curative (produit à base de diméthoate) trois semaines après le dernier traitement curatif ou 10 jours après le dernier traitement préventif.

Lutte biologique

Un renouvellement de l'application avec Syneis-appât peut avoir lieu 15 jours après le précédent traitement, ou après une pluie supérieure à 5 millimètres.

OLEICULTURE
LES AVERTISSEMENTS



Association Française Interprofessionnelle de l'Olive

Maison des Agriculteurs 22 Avenue Henri Pontier 13626 AIX EN PROVENCE
Contact : Célia GRATRAUD Tel.04.42.23.01.92 Email : cgratraud@ctollivier.org - www.afidol.org



Page 1 sur 1

INFOLIVE est une feuille d'information oléicole diffusée aux abonnés par fax (18,30 € TTC par an) ou par courrier électronique (gratuit). 24 numéros annuels, périodicité adaptée aux informations.

ZONE DE PRODUCTION AU-DESSUS DE 300 METRES D'ALTITUDE

Le piégeage des adultes commence à diminuer.

Lutte raisonnée

Pour la production d'olives de table, un traitement préventif peut être réalisé 15 jours après le précédent traitement préventif, avec des produits à base de lambda-cyhalothrine, de deltaméthrine ou de spinosad.

Toujours pour les olives de table, si le taux de piqûres de ponte est supérieur à 2% d'olives, il est préférable d'utiliser la lutte curative (produit à base de diméthoate) trois semaines après le dernier traitement curatif ou 10 jours après le dernier traitement préventif.

Pour les olives à huile, le traitement préventif n'est plus nécessaire. Si le taux de piqûres de ponte est supérieur à 10%, il est préférable d'utiliser la lutte curative (produit à base de diméthoate) trois semaines après le dernier traitement curatif ou 10 jours après le dernier traitement préventif.

Lutte biologique

Pour les olives à huile aucun traitement n'est nécessaire.

Rappel des stratégies et liste des produits autorisés : se reporter aux pages 16 à 25 du *Dossier technique OLIVIER 2008*.

ATTENTION AU DÉLAI AVANT RÉCOLTE DES PRODUITS

Matière active	Recommandations	Délai d'emploi avant récolte
Spinosad	Pas plus de 4 traitements dans la saison	7 jours
Deltaméthrine	Pas plus de 3 traitements dans la saison	15 jours
Lambda-cyhalothrine	Pas plus de 2 traitements dans la saison	7 à 60 jours selon les spécialités
Diazinon	Pas plus d'1 traitement dans la saison	21 jours
Diméthoate	Respect des bonnes pratiques agricoles	21 jours



Afidol

Infolive Protection raisonnée

Bulletin n°10a, le 30 septembre 2008

Œil de paon

Rappel : sur les variétés sensibles, le traitement préventif est à renouveler à l'approche d'un épisode pluvieux, et également dans les conditions suivantes :

- si vous observez plus de 15% de feuilles malades.
- si la dernière application préventive date de plus d'1 mois.
- si les précipitations de la semaine dernière ont dépassé 25 à 40 mm selon les spécialités.

(Stratégies et liste des spécialités utilisables : se reporter aux pages 36 à 40 du dossier technique OLIVIER 2008).

Page 3 sur 3

INFOLIVE est une feuille d'information oléicole diffusée aux abonnés par fax (18,30 € TTC par an) ou par courrier électronique (gratuit). 24 numéros annuels, périodicité adaptée aux informations.



Association Française Interprofessionnelle de l'Olive

Maison des Agriculteurs 22 Avenue Henri Pontier 13626 AIX EN PROVENCE
Contact : Cécilia GRATRAUD Tel.04.42.23.01.92 Email : cgratraud@ctollivier.org - www.afidol.org

