



## Bulletin de Santé de l'Olivier

n° 20  
le 20 octobre 2009

### La mouche de l'olive

Comme nous l'avions annoncé, **la chute des températures a entraîné une diminution importante des captures de mouches sur toutes les régions**. Certaines parcelles abritées ou dans des zones plus clémentes du littoral du Var, des Alpes-Maritimes, des Pyrénées-Orientales ou de la Corse... capturent cependant toujours quelques adultes.

Les vols annoncés entre 150 et 450 m sont donc décalés à début novembre, si les températures augmentent de 3°C par rapport à la moyenne journalière actuelle. Si des émergences ont toutefois lieu, cette population devrait faire très peu de dégâts, tout comme celle émergée la semaine dernière à basse altitude. Des températures inférieures à 9°C limitent en effet l'évolution des larves et l'activité de ponte des femelles.

Si la récolte a lieu précocement (octobre et novembre), il est inutile de prévoir une protection: les piqûres effectuées actuellement ne permettront pas un développement larvaire préjudiciable à la qualité de l'huile.




Un épisode pluvieux est annoncé cette semaine avec un léger radoucissement des températures. Surveiller les parcelles sensibles.

*Pour les vergers situés en zone littorale provençale, dans les Pyrénées-Orientales, dans les Alpes-Maritimes et en Corse*, surveiller le piégeage et les dégâts sur votre verger, surtout sur les variétés tardives encore vertes.

*Pour les vergers situés au dessus de 300 m d'altitude*, plus d'interventions à prévoir contre ce ravageur.

*Pour les vergers situés en dessous de 300 m d'altitude*, restez prudents et surveillez vos pièges.

#### Rappel de réglementation:




-  Toutes les spécialités à base de diméthoate (Techn'oate, Rogor, Dimate, Dimézyl) ont un délai avant récolte de 21 jours sur olives.
-  Le Techn'oate et le Dimézyl ne doivent plus être utilisés.
-  La lambda-cyhalothrine (Karaté, Pool..) est limitée à 2 applications / an.  
La deltaméthrine (Decis, Pearl, Split Protech) est limitée à 3 applications / an.  
Le spinosad (Syneïs Appât) est limité à 4 applications / an.

### L'oeil de paon

L'apparition de nouvelles tâches dues aux contaminations du 8 octobre est retardée à cause de la baisse des températures et devrait intervenir à la fin de la semaine.

Un épisode pluvieux est annoncé pour cette semaine et pourrait être favorable au développement du champignon. Soyez vigilants sur verger sensible.

#### Rappel de réglementation:

-  Toutes les spécialités à base de cuivre sont limitées à 6kg de cuivre métal / ha / an ce qui correspond à 2,5 applications à la bouillie bordelaise à dose homologuée (12,5 kg/ ha).
-  Le Dithane Neotech (mancozèbe) est limité à 2 applications / an.
-  Le délai avant récolte des fongicides autorisés sur oliviers est de :
  - 21 jours pour le Dithane Neotech
  - 30 jours pour le Strobry DF
  - 3 à 21 jours selon les spécialités pour les produits à base de cuivre (voir l'étiquette)



Le BSO est un Bulletin de Santé du Végétal édité par l'AFIDOL pour la Chambre Régionale d'Agriculture  
Maison des agriculteurs - 22 Avenue Henri Pontier  
13626 Aix-en-Provence cedex 1  
Tél: 04 42 23 01 92 - Fax: 04 42 23 82 56 - contact@afidol.org

Comité de rédaction : Le Bulletin de Santé de l'Olivier est réalisé par les techniciens oléicoles du Centre Technique de l'Olivier, du Service Régional de l'Alimentation, des Chambres d'Agriculture à partir des données acquises par les réseaux régionaux

Crédits photos : AFIDOL sauf mention particulière



Provence-Alpes-Côte d'Azur



Rhône-Alpes

